



SEMESTRAL

UNI

academiacesarvallejo.edu.pe

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

SEMESTRAL
UNI



Álgebra

Tema: Ecuaciones polinomiales I

Docente: Segundo Heli Chiroque Reyes

ECUACIÓN

Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones matemáticas, donde esta presente al menos una variable (incógnita).

Ejemplos:

$$\diamond 21x^2 - 13x + 2 = 0$$

$$\diamond \log_x(2x^2 - 7x + 12) = 2$$

$$\diamond \frac{3}{1+x+x^2} = 3 - x - x^2$$

Teorema

$$\text{Si } a \cdot b = 0 \leftrightarrow a = 0 \vee b = 0$$

Ejemplo: Si $(3x - 2)(x + 4) = 0$

$$\rightarrow 3x - 2 = 0 \vee x + 4 = 0$$

$$\rightarrow x = \frac{2}{3} \vee x = -4$$

Solución de una ecuación

Es el valor que toma la variable (incógnita) y verifica la ecuación.

Conjunto solución (CS)

Es el conjunto formado por todas las soluciones de una ecuación.

Ejemplo

Dada la ecuación $(x + 1)(x^2 - 38x + 105) = 0$

Factorizamos $(x + 1)(x - 3)(x - 35) = 0$

$$\rightarrow x + 1 = 0 \vee x - 3 = 0 \vee x - 35 = 0$$

$$\rightarrow \underbrace{x = -1 \vee x = 3 \vee x = 35}_{\text{son soluciones de la ecuación}}$$

son soluciones de la ecuación

$$\text{Luego, } CS = \{-1; 3; 35\}$$

ECUACIÓN POLINOMIAL

Es aquella ecuación que presenta la siguiente forma general

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n = 0$$

Donde $n \in \mathbb{Z}_0^+$, x es la incógnita y

$a_0; a_1; a_2; \dots; a_n$ son los coeficientes ($a_0 \neq 0$)

RAÍZ DE UN POLINOMIO

Dado un polinomio $P_{(x)}$ no constante, diremos que α es una raíz del polinomio $P_{(x)}$ si y solo si $P_{(\alpha)} = 0$.

Ejemplos:

❖ Sea $P_{(x)} = 3x - 21$

7 es raíz del polinomio, pues: $P_{(7)} = 0$

❖ $P_{(x)} = 3(2 - x)(x + 5)$

Se observa que:

2 es raíz de $P_{(x)}$, pues: $P_{(2)} = 0$

-5 es raíz de $P_{(x)}$, pues: $P_{(-5)} = 0$

Teorema del factor

α es raíz de $P_{(x)} \leftrightarrow (x - \alpha)$ es factor de $P_{(x)}$

Es decir, si $(x - \alpha)$ es factor de $P_{(x)}$, existe un polinomio $Q_{(x)}$ tal que:

$$P_{(x)} = (x - \alpha) \cdot Q_{(x)}$$

Ejemplo:

❖ Si -6 es raíz de $P_{(x)}$

$\rightarrow (x - (-6))$ es factor de $P_{(x)}$

$\rightarrow$ existe $Q_{(x)}$ tal que: $P_{(x)} = (x + 6) \cdot Q_{(x)}$

RAÍZ DE MULTIPLICIDAD k

Sea $P_{(x)}$ un polinomio de grado $n \geq 1$

Diremos que α es una raíz de multiplicidad k del polinomio $P_{(x)}$ si y solo si $(x - \alpha)^k$ es un factor de $P_{(x)}$.

Es decir: $P_{(x)} = (x - \alpha)^k \cdot Q_{(x)}$; $Q_{(\alpha)} \neq 0$.

Si $k = 1$, diremos que α es raíz simple.

Ejemplo: Dado el polinomio

$$P_{(x)} = (x - 4)(x - 3)^2(x - 2)^3$$

Sus raíces son:

4 ;

3 ; 3

; 2 ; 2 ; 2

Raíz
simple

Raíz de multiplicidad
dos o raíz doble

Raíz de multiplicidad
tres o raíz triple

Teorema fundamental del álgebra

Todo polinomio de grado $n \geq 1$, con coeficientes complejos, posee al menos una raíz compleja.

Corolario

Todo polinomio de grado $n \geq 1$, tiene exactamente n raíces (contadas con la multiplicidad).

Ejemplos

❖ $R(x) = 7x^2 - 6x - 1$, tiene 2 raíces

❖ $Q(x) = x^3 - 12x + 11$, tiene 3 raíces

Aplicación

Dado el polinomio $P_{(x)} = x^3 + ax^2 + bx + c$. Si 2 y 3 son raíces de $P_{(x)}$, además $P_{(4)} = 16$.
Determine el valor de $a + b + c$.

A) 13 B) 9 C) 5 D) 12 E) 20

Resolución**ECUACIÓN CUADRÁTICA**

Su forma general es:

$$ax^2 + bx + c = 0 ; \{a, b, c\} \subset \mathbb{C}, a \neq 0$$

Toda ecuación cuadrática tiene 2 raíces

Fórmula general

Las dos raíces de la ecuación

$$ax^2 + bx + c = 0; \quad a \neq 0$$

son:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} ; \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Donde:

$$\Delta = b^2 - 4ac, \text{ es el discriminante}$$

Ejemplo: Resuelva la ecuación

$$2x^2 - 2(1 + i)x + i = 0 ; \quad i = \sqrt{-1}$$

Resolución

$$\Delta = (-2(1 + i))^2 - 4(2)(i)$$

$$\Delta = 0$$

Reemplazamos en la fórmula general

$$x_1 = \frac{-(-2(1 + i)) + \sqrt{0}}{2(2)} ; x_2 = \frac{-(-2(1 + i)) - \sqrt{0}}{2(2)}$$

$$x_1 = \frac{1 + i}{2} ; x_2 = \frac{1 + i}{2}$$

$$\therefore CS = \left\{ \frac{1 + i}{2} \right\}$$

Naturaleza de las raíces

$$ax^2 + bx + c = 0 ; \quad a \neq 0, \{a; b; c\} \subset \mathbb{R}$$

$\Delta > 0$	Raíces reales diferentes
$\Delta = 0$	Raíces reales e iguales (única solución)
$\Delta < 0$	Raíces imaginarias y conjugadas

Aplicación

Para qué valores de a en la ecuación cuadrática:

$$x^2 - 3x + a - 4 = 0$$

tiene raíces reales

Resolución



TEOREMAS DE CARDANO - VIETTE

Sean x_1 y x_2 raíces de la ecuación cuadrática

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Se cumple:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

Suma de raíces

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Producto de raíces

NOTA

$$(x_1 + x_2)^2 - (x_1 - x_2)^2 = 4x_1x_2$$

Aplicación

Dada la ecuación $2x^2 + mx + 30 = 0$ y x_1 y x_2 sus raíces, indique el menor valor de m se cumple la relación $\frac{x_1}{x_2} = \frac{5}{3}$.

A) -8 B) -4 C) -20 D) -16 E) -1

Resolución

Aplicación

Dada la ecuación cuadrática

$$cx^2 + bx + a = 0$$

De raíces x_1 y x_2 tal que $x_1 - x_2 = 1$, encuentre una relación entre a , b y c .

- A) $b + c^2 = 4ac$ B) $b - c = 4ac$ C) $b^2 - 4ac = c^2$
 D) $c^2 - b^2 = 4ac$ E) $a^2 - b = 4ab$

Resolución**Aplicación**

Si el conjunto solución de la ecuación cuadrática.

$$x^2 + px + q = 0$$

es $\{\Delta + 2; \Delta + 3\}$, además tiene raíces positivas.

Determine el valor de $p + q$.

- A) 7 B) $83/4$ C) 21 D) $55/4$ E) 5

Resolución

DEFINICIONES

Sean x_1 y x_2 las raíces de $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$.

Diremos que la ecuación tiene:

Raíces simétricas, si

$$x_1 + x_2 = 0$$

Raíces recíprocas, si

$$x_1 \cdot x_2 = 1$$

Teorema (ecuaciones equivalentes)

Si las ecuaciones cuadráticas

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0, & abc &\neq 0 \text{ y} \\ mx^2 + nx + p &= 0, & mnp &\neq 0 \end{aligned}$$

son equivalentes **(tienen las mismas soluciones)**

Se cumple: $\frac{a}{m} = \frac{b}{n} = \frac{c}{p}$

Aplicación

Si las ecuaciones de incógnita x

$$(6m - 2)x^2 - 5m + 1 = 0,$$

$$8x^2 - (4n + 2)x - 2 = 0$$

son equivalentes, halle el valor de $m + n$.

A) 7

B) 5

C) 10

D) 3

E) 2

Resolución

ECUACIÓN BICUADRADA

Es aquella ecuación de cuarto grado, que tiene la siguiente forma general:

$$ax^4 + bx^2 + c = 0, \quad abc \neq 0$$


Ejemplo

Resuelva la ecuación $x^4 - 7x^2 - 144 = 0$

Resolución

PROPIEDADES

Dada la ecuación bicuadrada:



$$ax^4 + bx^2 + c = 0$$

- Sus raíces tienen la forma: $\alpha ; -\alpha ; \beta ; -\beta$
- $\alpha^2 + \beta^2 = -\frac{b}{a}$
 $\alpha^2 \cdot \beta^2 = \frac{c}{a}$
- Si sus raíces están en P.A. estas tienen la forma

$$-3k, -k, k, 3k ; \text{ razón} = 2k$$
- Si $b^2 - 4ac < 0$, entonces las raíces de la ecuación son de la forma:

$$m + ni, \quad m - ni, \quad -m - ni, \quad -m + ni$$

Aplicación

Si la ecuación bicuadrada

$$x^4 - 30x^2 + (m + 1)^2 = 0$$

tiene raíces en P.A. . Calcule la suma de valores de m .

- A) 2 B) 8 C) -2 D) 10 E) 0

Resolución**Aplicación**

Dada la ecuación bicuadrada de incógnita x .

$$x^4 - (a + 4)x^2 + 4a = 0$$

Halle el valor de a para que la suma de raíces positivas sea 4.

- A) 36 B) -4 C) 6 D) 4 E) 9

Resolución



GRACIAS

SÍGUENOS:   

academiacesarvallejo.edu.pe